
GEL DE *Caesalpinia ferrea* Mart.

SINONÍMIA

Libidibia ferrea (Mart. ex. Tul.) L.P. Queiroz

NOMENCLATURA POPULAR

Jucá.

FÓRMULA

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
extrato glicólico do fruto de <i>Caesalpinia ferrea</i>	5%
gel base	q.s.p.

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Transferir o extrato de jucá para recipiente adequado. Incorporar no gel base e misturar até homogeneização completa.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Acondicionar em pote plástico não transparente. Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora do alcance de crianças.

INDICAÇÕES

Cicatrizante e antisséptico (BACCHI *et al.*, 1994; CARVALHO *et al.*, 1996; ARAÚJO *et al.*, 2008).

MODO DE USAR

Aplicar no local afetado até três vezes ao dia.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, T. A. S., ALENCAR, N.L., DE AMORIM, E. L. C., ALBUQUERQUE, U. P. A new approach to study medicinal plants with tannins and flavonoids contents from the local knowledge. **Journal of Ethnopharmacology**, 120, 72-80, 2008.

BACCHI, E. M., SERTIE, J. A. A. Antiulcer Action of *Styrax camporum* and *Caesalpinia ferrea* in Rats. *Planta Med.*, 60, 118-120, 1994.

CARVALHO, J. C. T., TEIXEIRA, J. R. M., SOUZA, P. J. C., BASTOS, J. K., DOS SANTOS FILHO, D., SARTI, S. J. Preliminary studies of analgesic and anti-inflammatory properties of *Caesalpinia ferrea* crude extract. **Journal of Ethnopharmacology**, 53, 175-178, 1996.
