
XAROPE DE *Mikania glomerata* Sprengel E XAROPE DE *M. laevigata* Schultz Bip.

SINONÍMIA

M. scansoria DC, (*Mikania glomerata*).

NOMENCLATURA POPULAR

Guaco.

FÓRMULA

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
tintura de guaco 20%	10 mL
xarope simples q.s.p.	100 mL

<i>Componentes</i>	<i>Quantidade</i>
extrato fluido de guaco	5 mL
xarope simples q.s.p.	100 mL

ORIENTAÇÕES PARA O PREPARO

Preparar a tintura ou o extrato fluido conforme descrito em *Informações Gerais em Generalidades (4)*. Transferir a tintura 20% ou o extrato fluido para recipiente adequado. Solubilizar com o auxílio da formulação básica de xarope. Completar o volume e homogeneizar.

Nota: utilizar a formulação básica de xarope, fria, no preparo dessa formulação.

ADVERTÊNCIAS

Não usar em pessoas com *Diabetes mellitus*, gestantes, lactantes e crianças menores de dois anos. Não usar em caso de tratamento com anticoagulantes.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Acondicionar em frasco de vidro âmbar. Armazenar em local fresco, seco e ao abrigo da luz.

INDICAÇÕES

Expectorante.

MODO DE USAR

Uso interno.

Crianças de três a sete anos: tomar 2,5 mL do xarope, duas vezes ao dia. Crianças de acima de sete a 12 anos: tomar 2,5 mL do xarope, três vezes ao dia. Acima de 12 anos: tomar 5 mL do xarope, três vezes ao dia. Agitar antes de usar.

Nota: nos casos de afecções respiratórias agudas, recomenda-se o uso por sete dias consecutivos. Em casos crônicos, usar por duas semanas.
